

SULFASSALAZINA

Também conhecida como salazossulfapiridina, é utilizada no tratamento da colite ulcerativa e da artrite reumatóide. Ao ser biotransformada, uma parte atinge o cólon, onde, por ação de bactérias intestinais, forma a sulfapiridina, inativa na colite, e o ácido 5-aminossalicílico, também conhecido como mesalamina, que atua localmente. Esse último parece exercer uma ação antiinflamatória através da inibição da cicloxigenase e da lipoxigenase. Como consequência, diminui a produção de prostaglandinas, leucotrienos e de ácidos hidroxicosatetraenólicos, além de exercer uma atividade removedora de radicais livres.

FARMACODINÂMICA

Antiinflamatório intestinal, anti-reumático.

INDICAÇÕES

- Tratamento da retocolite ulcerativa inespecífica, colite ulcerativa média ou moderada, doença de Crohn.
- Tratamento da artrite reumatóide e espondilite anquilosante.

DOSES

- Iniciar com 500mg de 6 em 6 horas ou de 12 em 12 horas. A dose recomendada é de 1g cada 6 ou 8 horas.
- Para manutenção, 500 mg cada 6 horas.

CONTRA INDICAÇÕES

- Hipersensibilidade a sulfassalazina, sulfonamidas ou salicilatos.
- Gravidez e lactação
- Crianças < 2 anos

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- pode prolongar o efeito dos anticoagulantes orais, anticonvulsivantes e antidiabéticos orais.
- uso concomitante de depressores da medula óssea, metotrexato, sulfimpirazona e fenilbutazona aumenta os efeitos destes.
- diminui absorção dos digitálicos e do ácido fólico.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro/ Zé Garoto Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam