

# SlimCarb®

## Reduz a absorção de gorduras



*Inibe a enzima  
lipase pancreática*



*Efeito antiadipogênico*



**Farmacam**



**SLIMCARB®** é um fitoativo padronizado em 20% saponinas triterpenoides e 1% mangiferin, que auxilia no combate à obesidade, por interferir no metabolismo de macronutrientes – gorduras e carboidratos, reduzindo sua quebra e absorção.

## Redução da absorção de gorduras e carboidratos

Os efeitos do **SLIMCARB®** na inibição da absorção de carboidratos estão relacionados à redução da atividade das enzimas  $\alpha$ -amilase e  $\alpha$ -glicosidase, reduzindo a absorção de amido e glicose. A enzima lipase pancreática é responsável pela quebra de 50 a 70% das gorduras ingeridas na dieta. **SLIMCARB®** atua diretamente nesta enzima, inibindo a sua atividade, e reduzindo a absorção das gorduras ingeridas.

## Estudos

Ensaio clínico controlado por placebo tipo cross over ou com inversão dos tratamentos no mesmo grupo, foram avaliados 20 indivíduos (homens e mulheres - idade média de 58 anos) e portadores de diabetes do tipo 2, com elevação da hiperglicemia de jejum, mas sem a implementação de medicamentos convencionais hipoglicemiantes. (KAJIMOTO OKS et al., 2015).

## Os indivíduos foram divididos em dois grupos:




Grupo 1

6 semanas tratados com o fitoativo e 6 semanas seguintes com placebo.

Grupo 2

6 semanas tratados com o placebo e 6 semanas seguintes tratados com o fitoativo.

Os resultados indicam que o fitoativo proporcionou redução significativa da glicemia de jejum "Figura 1", hemoglobina glicada "Figura 2" e índice de massa corporal "Figura 3".



## Você sabia?

**Slimcarb®** auxilia a reduzir expressão PPAR $\gamma$ , prevenindo a maturação dos adipócitos e dificultando seu acúmulo e crescimento. Contribuindo assim, para o gerenciamento do peso.

## Posologia e modo de usar

Ingerir uma dose de 200 mg de **SLIMCARB®**, duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições.

## Contraindicações

A administração oral de **SLIMCARB®**, nas doses recomendadas, apresenta boa tolerabilidade (deve ser utilizado com cautela em indivíduos que já fazem uso de hipoglicemiantes). **SLIMCARB®** não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

## Referências

KAJIMOTO OKS et al. Effects of a diet containing *Salacia reticulata* on mild type 2 diabetes in humans a placebo controlled, cross over trial. *J Jpn Soc Nutr Food Sci.*, 2000; 53(5): 199-205.  
KKIU A, SUBASINGHE S. *Salacia reticulata* weight: a review of botany, phytochemistry and pharmacology. *Tropical Agricultural Research & Extension* 13(2): 2010.



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam