

ÁCIDO RETINÓICO

Corresponde ao ácido trans-retinóico, derivado da vitamina A . Parece atuar aumentando a mitose e a renovação das células epidérmicas, diminuindo assim a coesividade das células epiteliais foliculares, facilitando a extrusão de comedões existentes e pode impedir a formação de novos. É absorvida parcialmente; cerca de 5% da dose aplicada topicamente é recuperada na urina.

INDICAÇÕES:

Tratamento de acne vulgar, ictiose lamelar, queratose folicular e verruga plana.

DOSE:

A tretinoína é aplicada na forma de creme, gel ou solução alcoólica na concentração de 0,01 a 0,10%. Uma preparação contendo 0,05% de ac. retinóico é indicado p/ o tratamento de hiperpigmentação , aspereza e pequenas rugas. A pele deve estar limpa e seca 15 a 30 minutos antes da aplicação, 1 a 2x/dia.

REAÇÕES ADVERSAS:

Fotossensibilização; hipopigmentação ou hiperpigmentação; eritema intenso e descamação nos locais da aplicação; sensação de calor ou urticante no local de aplicação.

PRECAUÇÕES:

Evitar aplicação perto dos olhos, pálpebras, boca, narinas e mucosas. Deve-se evitar a exposição à luz solar. Poderá haver exacerbação temporária da acne durante as primeiras semanas de tratamento, devido à ação em profundidade do fármaco, mas a terapia deverá continuar. Em casos de irritação intensa, deve-se interromper o tratamento. Não se recomenda o uso simultâneo de benzoperoxido sobre a mesma área da pele.

INTERAÇÕES:

Emprego concomitante de tretinoína c/sabões abrasivos, preparações p/acne, preparações contendo álcool, cosméticos ou sabões c/forte efeito secante podem causar efeito irritante ou secante cumulativo, resultando em irritação excessiva da pele.

CONTRA-INDICAÇÃO:

Sensibilidade ao fármaco, eczema, eritema solar, gravidez e lactação.

