

# CLORFENIRAMINA MALEATO

## IDENTIFICAÇÃO

**Fórmula Molecular:** C<sub>16</sub>H<sub>19</sub>ClN<sub>2</sub>.C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>.

**PM:** 390,86

**DCB:** 02442

**CAS:** 113-92-8

## PROPRIEDADES:

Clorfeniramina também chamada Clorfenamina, tem efeitos sedativos menos que os anti-histaminicos tradicionais. Atinge a concentração máxim em 2 a 6 horas e o efeito máximo em 6 horas. Sua ação dura 4 a 12 horas. A meia-vida de eliminação é de 14 a 25 horas.

## INDICAÇÃO

Constitui ingrediente de medicamentos para resfriados.

Maleato de Clorfeniramina é destinado ao tratamento dos sintomas da gripe, resfriado, dores de cabeça, febre, neuralgias, mialgias e dores reumáticas e distúrbios do estado geral decorrentes de alterações climáticas e de abuso de álcool ou nicotina.

Condições que se beneficiem com uso de analgésicos, antipiréticos, como afecções catarrais das vias aéreas superiores.

## DOSE E USO

Uso Oral, usado associados com outros medicamentos para resfriados.

## REAÇÕES ADVERSAS

A reação mais comum é a sonolência

## PRECAUÇÕES

Não se recomenda para menores de 12 anos

Evitar uso em recém-nascidos e prematuros devido à possibilidade de associação com síndrome da morte súbita infantil.

## CONTRA-INDICAÇÕES

O produto é contraindicado para pacientes que apresentarem casos anteriores de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode aumentar o risco de sangramentos.

Maleato de clorfeniramina não deve ser utilizado caso você tenha: problemas nos rins, deficiência genética da glicose-6-fosfodesidrogenase, porfiria hepática aguda (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas); granulocitopenia (situação em que a produção de células de defesa do sangue está reduzida); pressão arterial alta; tireotoxicose (situação em que há excesso de hormônio da tireoide no sangue); tenha alterações graves do coração e dos vasos sanguíneos e arritmias no coração, glaucoma de ângulo fechado (aumento da pressão nos olhos), obstrução do ducto biliar, hipertrofia prostática benigna (aumento da próstata), durante ataques agudos de asma, úlcera péptica estenosante (lesão localizada no estômago e/ou duodeno), obstrução piloroduodenal.

Não use este medicamento caso tenha úlcera no estômago.

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Existe possibilidade de interação medicamentosa com os seguintes medicamentos: isoniazida, anticoagulantes cumarínicos, antidiabéticos do tipo sulfonilureia, narcóticos ou álcool.

### **REFERÊNCIA**

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014

