

DILTIAZEN HCL

Identificação

Formula Molecular: C₂₂H₂₆N₂O₄S.HCl

PM: 451,00

DCB: 03038

CAS: 33 286 -22-5

Propriedades:

Diltiazem HCl (pertence ao grupo dos antagonistas de cálcio) produz o efeito anti-hipertensivo primariamente por relaxamento do músculo liso vascular e consequentemente diminui a resistência periférica vascular. Possui aspecto físico de pellets esféricos, na concentração em torno de 40%, sendo a forma de liberação prolongada do diltiazem HCl pó convencional.

Indicação

- Tratamento de hipertensão essencial
- Tratamento de Angina Clássica
- Tratamento de Angina vasoespástica
- Profilaxia e tratamento de taquiarritmias supraventriculares

Dose e Uso

- Via Oral, adultos, como antiarrítmicos ou anti-hipertensivo, 60 a 120 mg três vezes ao dia, antes das refeições.
- Via oral adultos, como antianginoso, inicialmente, 30 mg quatro vezes ao dia, antes das refeições. A dose pode ser aumentada gradualmente até o máximo de 360 mg diariamente.

Reações adversas

- Bradicardia, tontura, fraqueza, cefaleia, rubor, secura da boca.
- Edema de tornozelos, distúrbios gastrointestinais, reações dermatológicas, como necrose epidérmica.
- Síndrome de Stevens-Johnson, doença potencialmente fatal.

Precauções

Betabloqueadores e digitálicos podem acentuar efeitos retardadores da condução AV. Usar com cautela e vigilância médica frequente na insuficiência cardíaca congestiva. Pode ocorrer, ocasionalmente, hipotensão arterial sintomática e dose-dependente. Em casos raros pode sobrevir elevação reversível das enzimas hepáticas. Recomendam-se cuidados especiais em casos de insuficiência hepática ou renal. Usar com precaução em indivíduos idosos, pois a meia-vida dos bloqueadores dos canais de cálcio pode estar aumentada.

Interações

Compatível com nitroglicerina sublingual no tratamento de acessos agudos e com nitratos, para fins profiláticos, embora o tratamento com cloridrato de



diltiazem possa tornar dispensável ou infrequente seu emprego. Betabloqueadores: vide Advertências. Ao associar com anti-hipertensivos, ter em conta a própria ação anti-hipertensiva do cloridrato de diltiazem e possível soma de efeitos. O cloridrato de diltiazem pode elevar a concentração plasmática de digoxina utilizada concomitantemente. Interações alimentares Não há dados na literatura a respeito de interações com alimentos. Alteração de exames laboratoriais Não há dados na literatura a respeito de alterações em exames laboratoriais.

Contra-Indicações

Hipersensibilidade ao Diltiazem. Gravidez. Hipotensão arterial severa (sistólica <90mmHg). Bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau na ausência de marca-passo artificial funcionando. Doença do nó sinusal. Infarto agudo do miocárdio. Congestão pulmonar

Referências

1. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014

