

EXTRADERM GEL CARBOPOL ANIÔNICO

CAS: Não aplicável.

DCB: Não aplicável.

Fórmula Molecular: Não aplicável.

Peso Molecular: Não aplicável.

Composição: aqua, propyleneglycol, carbomer, phenoxyethano, methylparaben, propylparaben, butylparaben, ethylparaben, imidazolidinyl urea, dissodium EDTA, sodium hydroxide.

Uso: Tópico

Os Extraderm Gel Carbopol Aniônico é uma base gel pronta para incorporar ativos e ideal para agilizar o processo de manipulação, não sendo necessário realizar o preparo do gel, e obtendo muito mais estabilidade para os manipulados.

Suporta a incorporação de até 20% de ativos, apresenta muita transparência. Devido seu caráter aniônico apresenta incompatibilidades com polímeros catiônicos, ácidos fortes e altas concentrações de eletrólitos.

APLICAÇÃO

- Manipulação de géis viscosos transparentes ou gel-creme.

COMPATIBILIDADES

Peróxido de benzoíla, Eritromicina, Clindamicina, extratos vegetais, LCD, corticoides, e outros ativos cosméticos ou insumos farmacêuticos utilizados na manipulação.

DOSAGEM SUGERIDA

- **Oral:** Não aplicável.
- **Tópico:** usar conforme necessidade de cada formulação, podendo incorporar até 20% de ativos.
- **Fator de correção:** Não aplicável.

ADVERTÊNCIAS

Pode causar alergias caso tenham hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper o uso do produto e consultar o médico.

EFEITOS ADVERSOS

Nas referências consultadas, não foram encontrados efeitos adversos.

INFORMAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Evite temperaturas extremas.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Gel para Flacidez dos Seios

Componentes	Quantidades
Elastina	5%
Extrato de Algas Marinhas	4%
Extraderm Gel Carbopol Anionico qsp	100g
Posologia: Aplicar massageando com movimentos circulares até completa absorção.	

Gel Redutor

Componentes	Quantidades
Cânfora	2%
Mentol	2%
Azuleno	0,02%
Gel de Carbopol qsp	100g
Posologia: Aplicar em dias alternados, uma camada fina no abdômen e coxas, e esperar secar. Aplicar uma segunda camada, seguida de exercícios físicos. Retirar a camada excedente e banhar-se após um intervalo de meia hora. Nos outros dias, recomenda-se massagear as regiões afetadas com cremes contendo enzimas (hialuronidase ou thiomucase).	
OBS: Não deve ser usado durante o período menstrual ou na presença de infecções gênito-urinárias, mesmo corrimentos. Não deve ser aplicado no tórax ou em articulações e devem-se tomar precauções em pessoas hipertensas, com problemas renais ou circulatórios. Não deve ser aplicado antes de deitar. O seu uso é contraindicado na gravidez.	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

REFERÊNCIAS

1. Informações técnicas do fabricante.
2. Guia Prático da Farmácia Magistral 5. Edição, Juiz de Fora Pharmabooks. 2019.
3. BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO, Y. Formulário Médico Farmacêutico. 6.ed. São Paulo: Pharmabooks. 2021.

Rev.1 – 25/11/2024.