



LORATADINA

A Loratadina é um anti-histamínico tricíclico potente, de ação prolongada, com atividade seletiva antagônica dos receptores H1 periféricos. A Loratadina previne, mas não reverte as respostas mediadas pela histamina liberada. A ingestão com alimentos aumenta a absorção gastrointestinal em cerca de 40%. A ligação protéica é de 97%, sofre a biotransformação, originando um metabólito ativo (descarbo- etoxiloratidina). Início de efeito em cerca de 30 minutos; com duração do efeito de 24 horas. A excreção é principalmente fecal.

INDICAÇÕES:

A Loratadina é indicada no tratamento sintomático de manifestações alérgicas diversas: rinite (alérgica ou vasomotora), espirros, rinorréia, edema de Quincke, urticária, prurido, angioedema, dermatografismo, e reações anafiláticas (como adjuvante).

DOSE:

Adultos, 10 mg/dia, via oral, 1x/dia. Crianças de 2 a 12 anos: 5mg/dia.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações ocasionais / raras: discrasia sangüínea, aumento da sensibilidade da pele à luz solar, anorexia, zumbido, exantema, desconforto ou dores estomacais, sonolência.

Sintomas de overdose: efeitos anticolinérgicos, depressão ou estimulação do SNC e hipotensão.

PRECAUÇÕES:

Ingerir com água, leite ou alimentos a fim de amenizar a irritação gástrica.

INTERAÇÕES:

Deve ser suspensa a administração de Loratadina 48 horas antes de qualquer teste cutâneo, dado que os anti-histamínicos podem impedir ou diminuir as reações que, de outro modo, seriam positivas aos indicadores de reatividade dérmica.

CONTRA-INDICAÇÕES:

A Loratadina é contra-indicada em pacientes com predisposição à retenção urinária, obstrução da bexiga, hipertrofia prostática sintomática, glaucoma (de ângulos aberto ou fechado).

