

LOSARTAN POTÁSSIO

IDENTIFICAÇÃO

Formula Molecular: C₂₂H₂₂ClKN₆O

PM: 461,0

DCB: 05432 (Losartana Potassica)

CAS: 124750-99-8

PROPRIEDADES:

Atua como antagonista não peptídico potente do receptor da angiotensina II, tendo alta afinidade e seletividade pelo receptor AT, sem apresentar atividade agonistas, nem efeito de abstinência após suspensão da terapia em pacientes hipertensos. Ele inibe a ligação da angiotensina II a este receptor, acarretando aumento na atividade da renina plasmática e consequentes aumentos na concentração da angiotensina II plasmática. É melhor tolerado que vários outros agentes anti-hipertensivo.

Usado como Losartano Potássico.

INDICAÇÃO

Tratamento de hipertensão, quer isolado quer em associação com outros agentes anti-hipertensivo.

DOSE E USO

• Via oral, adultos, 50 mg, uma vez ao dia, podendo ser aumentada para 100 mg uma vez ao dia; em pacientes com disfunção hepática, deve-se diminuir a dose; em pacientes com depleção do volume intravascular (como tratados em doses altas de diuréticos), a dose inicial deve ser reduzida 25 mg uma vez ao dia; a dose de manutenção é de 25 a 100 mg ao dia, podendo ser tomada de uma só vez ou divididas em duas tomadas.

• Para crianças > 6anos, iniciar com 0,7 mg/Kg uma vez ao dia, até uma dose de 50 mg.

REAÇÕES ADVERSAS

- Cefaléia, infecção do trato respiratório superior, tontura, astenia e fadiga.
- Efeitos ortostáticos
- Erupção cutânea
- Hiperpotassemia
- Diarréia, cólicas ou dores musculares.
- Tosse seca, insônia, congestão nasal

PRECAUÇÕES

Antes de se começar a tomar Losartana potássica, deve-se informar o médico no caso de:

- História de inchaço de lábios, garganta ou língua;
- Vômitos ou diarreia excessivos;
- Bloqueio dos vasos sanguíneos que levam sangue ao rim;
- Transplante recente do fígado;
- Insuficiência cardíaca com ou sem insuficiência renal ou existir história de arritmias cardíacas;
- Problemas nas válvulas do coração;
- Doença coronária ou vascular cerebral;
- Hiperaldosteronismo;
- Uso de outros medicamentos para controlar a pressão arterial.



O médico avaliará a utilização do medicamento e adequará a posologia e duração do tratamento conforme o doente.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou durante a amamentação, assim como em crianças com menos de < 6 anos ou em crianças com depuração renal < 30 ml/min/1,73 m². Em caso de alergia a qualquer componente da fórmula ou problemas de fígado, também não se deve tomar medicamento contendo Losartana Potássica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Anti-inflamatórios não esteroides, sobretudo indometacina, podem antagonizar seu efeito.
- Ciclosporina, diuréticos poupadores de potássio, alimentos ou medicamentos contendo potássio podem causar hipotassemia
- Diuréticos podem acarretar hipotensão sintomática
- Outros medicamentos hipotensores podem produzir efeitos hipotensivos aditivos
- Simpatomiméticos podem reduzir seus efeitos.

REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014

