



MESALAZINA

A Mesalazina ou 5-ASA (ácido-5-aminosalicílico) possui ações antiinflamatória (inibidor da prostaglandinosintetase) no nível da mucosa ileal, colônica e retal. A Mesalazina é a fração ativa da molécula da sulfasalazina, que atuando localmente, bloqueia a síntese de prostaglandina, diminuindo a produção dos metabólitos do ácido araquidônico, que estão elevados nos pacientes com doenças crônicas inflamatórias intestinais. A absorção no cólon é baixa (<15%), excreção renal da fração absorvida, de 10 a 20% da dose, o restante, não absorvido, tem eliminação fecal.

INDICAÇÕES:

A Mesalazina é indicada no tratamento de colite distal ulcerativa moderada, proctosigmoidite e proctite; doenças inflamatórias intestinais.

DOSE:

A Mesalazina devem ser ingeridos antes das refeições e com bastante líquido. Fase aguda da colite ulcerosa: 1,5 a 2,5g ao dia, divididos em 3 ingestões. Tratamento intercrise: 1 a 1,5g ao dia divididos em 2 ou 3 ingestões. No caso de localizações retais ou retossigmoideas (a 20cm da margem anal): 2 a 3 supositórios ao dia durante 4 semanas.

REAÇÕES AVERSAS:

Reações mais freqüentes: cólica abdominal, dor de cabeça; náuseas; gases.

PRECAUÇÕES:

- O alívio dos sintomas pode ocorrer dentro de 3 a 21 dias, contudo, o tempo usual de resposta terapêutica é de 3 a 6 meses, dependendo dos sintomas e exames sigmoidoscópicos.
- A segurança e eficácia não estão definidas nas crianças.
- O risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: hipersensibilidade e comprometimento renal.

CONTRA-INDICAÇÕES:

A Mesalazina é contra-indicada em pacientes com hipersensibilidade aos salicilatos, e Úlcera gastroduodenal.

