

NALTREXONA HCL (C1)

IDENTIFICAÇÃO

Fórmula Molecular: C₂₀H₂₃NO₄.HCL

PM: 377,9

DCB: 06213

CAS: 16676-29-2

PROPRIEDADES:

É antagonista opioide derivado da morfina utilizado como adjuvante no tratamento de desintoxicação em pacientes dependentes dos opióides. Inibe competitivamente as ações destes, ligando-se aos receptores opioides no SNC, bloqueando a euforia induzida pelo alcoolismo.

INDICAÇÃO

- Tratamento da dependência dos opioides
- Tratamento de alcoolismo

DOSE E USO

- Para tratamento da dependência dos opioides, iniciar com 25 mg por via oral. Na ausência de sinais de abstinência, administrar dose adicional de 25 mg uma hora depois
- Para manutenção, 50 mg ao dia
- Para manutenção alternativa, 350 mg por semana em um dos seguintes esquemas: a) 50 mg/dia de segunda a sexta-feira e 100 mg aos sábados; b) 100 mg a cada 48 horas ; c) 100 mg às segundas e quartas-feiras e 150 mg às sextas-feiras; d) 150 mg a cada 72 horas
- Para tratamento do alcoolismo, 50 mg/dia por via oral, por até 12 semanas.

REAÇÕES ADVERSAS

- Exantemas
- Ardência nos olhos, visão turva, edema ocular.
- Dispneia
- Ansiedade, confusão mental, alucinações, tremor.
- Desconforto a micção.
- Ulceração gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, náusea, vômito
- Hipertensão, taquicardia
- Febre, cefaleia, mialgia
- Coriza

PRECAUÇÕES

- Suspende vários dias antes de uma cirurgia eletiva, se for necessário o uso de um opióide
- A administração de doses elevadas de opioides para antagonizar o bloqueio da naltrexona pode produzir depressão respiratória grave ou colapso circulatório.

CONTRAINDICAÇÕES

- Hipersensibilidade á Naltrexona
- Em pacientes em uso a opioides
- Gravidez e lactação
- Idosos
- Crianças

- Síndrome de abstinência aguda de opioides

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- A administração com opioides pode precipitar síndrome de abstinência
- O uso concomitante de tioridazina produz sonolência e letargia
- Efeito aditivo com fármacos hepatotóxicos.

REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014.

