

## Orlistate

**CAS:** 96829-58-2

**DCB:** 06635

**Fórmula Molecular:** C<sub>29</sub>H<sub>53</sub>NO<sub>5</sub>

**Peso Molecular:** 495,71

**Uso:** Oral



O Orlistate é um ativo usado para o tratamento de pacientes com sobrepeso ou obesidade, incluindo pacientes com fatores de risco associados à obesidade, em conjunto com uma dieta de baixa caloria. O orlistate é eficaz no controle de peso em longo prazo (perda de peso, manutenção do peso e prevenção da recuperação do peso perdido). O orlistate melhora os fatores de risco associados ao excesso de peso, como hipercolesterolemia (colesterol alto no sangue), intolerância à glicose ("pré-diabetes"), diabetes do tipo 2, hiperinsulinemia, (insulina alta no sangue) hipertensão arterial (pressão alta), e promove também a redução da gordura visceral (localizada entre os órgãos abdominais). Pode ser utilizado também para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 com sobrepeso ou obesidade.

O ativo atua como inibidor das lípases gástricas e pancreáticas que limita a absorção da gordura ingerida na dieta. É utilizado isolado ou em associação a outros fármacos na manutenção da obesidade. Cerca de 30% da gordura ingerida com a alimentação é eliminada com as fezes. Portanto, o organismo deixará de armazenar parte da gorduras ingerida por refeição, auxiliando na redução do peso.

### Indicações:

- Tratamento da obesidade a longo prazo;
- Melhora colesterol alto no sangue;
- Melhora pré-diabetes;
- Melhora diabetes do tipo II;
- Auxilia na redução da gordura visceral.

### Dosagem:

**Oral:** 120 mg, 3 vezes ao dia, durante ou até uma hora após as principais refeições.

### Observação:

O orlistate deverá ser associado a uma alimentação com leve redução de calorias. No máximo 30% dessas calorias devem ser provenientes de gorduras. Você deve distribuir bem sua ingestão diária de gorduras, carboidratos e proteínas entre as três refeições principais.

### Advertências:

- Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas e lactantes.

### Efeitos Adversos:

O uso do ativo pode causar eventos adversos como: incontinência fecal, flatulência e esteatorreia. Entretanto, estes efeitos podem ser utilizados reduzindo a quantidade de gorduras da dieta.

## Informações farmacotécnica

- Insumo fotossensível, usar cápsulas opacas.
- Usar a mesma quantidade de excipiente e ativo.
- O orlistate pertence a classificação biofarmacêutica II (Para Ativos de Baixa Solubilidade).

## Sugestões de Fórmulas:

### Coadjuvante no tratamento da depressão

Componentes	Quantidades
Orlistate	120 mg
Carbotil HR	Qsp
<b>Posologia: 1 cápsula durante as refeições ou até 1 hora após.</b>	

### Infertilidade Feminina

Componentes	Quantidades
Orlistate	120 mg
Faseolamina	350 mg
Cassiolamina	300 mg
Carbotil HR	Qsp
<b>Posologia: 1 cápsula durante as refeições ou até 1 hora após.</b>	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.


## Referências:

1. Material técnico do fabricante.
2. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/ SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021.
3. Bula do medicamento Orlistate, ANVISA. Disponível em: <<https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=ORLISTATE>>. Acesso em: 09/06/2022.

Rev.1 – 09/06/2022 SAC/PE

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130  
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480

 [vendas@farmacam.com.br](mailto:vendas@farmacam.com.br)

 WhatsApp (21) 2604-7350

 [Facebook.com.br/farmacam](https://Facebook.com.br/farmacam)

 [Instagram.com.br/farmacam](https://Instagram.com.br/farmacam)