

CLOPIDOGREL

É análogo da ticlopidina, um derivado tienopiridinico, inibidor seletivo da agregação plaquetária. Atua ligando-se aos receptores ADP-adenicilase na superfície plaquetária, inibindo a ativação do complexo da glicoproteína GPIIb/IIIa mediada pelo ADP, reduzindo a formação de trombos tanto arteriais quanto venosos. O receptor de ADP, reduzindo forma irreversível, afetando as plaquetas em toda sua vida útil. É mais eficaz que a ticlopidina e reduz o risco de eventos isquêmicos em até 8,7% em relação ao ácido acetilsalicílico. Possui tolerabilidade superior a outros fármacos antiadesivos plaquetários na redução de complicações isquêmicas em pacientes com infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou doença arterial periférica, particularmente com relação a neutropenia. Também apresenta alguns efeitos adversos gastrintestinais e hepáticos menos acentuados do que com a administração do ácido acetilsalicílico, porém, exantema e diarreia com maior frequência. Comercializado como bissulfato.

Farmacodinâmica:

Antiadesivo plaquetário.

Farmacocinética:

- após administração oral é rapidamente absorvido cerca de 50%
- alta ligação protéica: 98%
- o metabólito do ácido carboxílico atinge a C máxima em cerca de uma hora.
- sofre biotransformação hepática através do sistema do citocromo P450, principalmente a isoenzima 2C9, por hidrólise, produzindo um metabólito inativo derivado do ácido carboxílico
- meia-vida de cerca de oito horas.
- duração da ação de aproximadamente cinco dias.
- 50% eliminados pelos rins e 46% pelas fezes.

Indicações:

- tratamento da redução de eventos ateroscleróticos, tais como infarto miocárdio, acidente vascular cerebral, conseqüências da doença vascular periférica.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam

Doses:

- 75mg uma vez ao dia.

Contra-indicações:

- hipersensibilidade ao clopidogrel
- gravidez e lactação.
- crianças.
- hemorragia ativa

Precauções:

- cautela na administração a portadores de insuficiência hepática, em risco de hemorragia em consequência de trauma ou cirurgia.
- suspender 7 dias antes da cirurgia em que não se deseje efeito antiadesivo plaquetário.


Efeitos Adversos:

- dor torácica, fadiga
- hipertensão, edema
- dor abdominal, dispepsia, náusea, diarreia.
- neutropenia
- hemorragia gastrointestinal, púrpura, epistaxe
- hipercolesterolemia.
- exantema
- depressão mental.

Interações medicamentosas:

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349

 vendas@farmacam.com.br

 [whatsapp \(21\) 98493-7033](https://www.whatsapp.com/chat?phone=5521984937033)

 [Facebook.com.br/farmacam](https://www.facebook.com/farmacam)

 [Instagram.com.br/farmacam](https://www.instagram.com/farmacam)

- potencializa o efeito do ácido acetilsalicílico na agregação plaquetária, mas não o efeito deste último sobre a inibição mediada pelo clopidogrel sobre a agregação induzida pelo ADP.
- risco de hemorragia se usado concomitantemente com antiinflamatórios não-esteróides, ácido acetilsalicílico ou varfarina.
- pode interferir com a biotransformação da fenitoína, tamoxifeno, tolbutamida, fluvastatina e outros fármacos biotransformados pela isoenzima 2c9.

Referências: Dicionário Terapêutico Guanabara.