

## CLORETO DE MAGNESIO

Ações Terapêuticas  
Anti-hipomagnesemia

Indicações  
Deficiência de magnésio

### Precauções

As soluções injetáveis de cloreto de magnésio podem produzir intoxicação; para evitá-la deve-se administrar uma solução de cálcio por via intravenosa. A respiração e pressão sangüínea devem ser cuidadosamente monitoradas durante e após a administração de cloreto de magnésio injetável. Por não existirem provas conclusivas, recomenda-se não usar em gestantes a menos que o benefício para a mãe supere o risco potencial para o feto. Não deve ser usado em casos de: insuficiência renal, cardiopatias severas, coma.

### Reações Adversas

Enrubescimento, sudorese, hipotensão, hipotermia, estupor e depressão respiratória.

### Posologia

Via intravenosa: 1 a 40/dia diluídos em solução de dextrose a 5%, razão de 4g por cada 250ml de solução, a uma velocidade de infusão não superior a 3ml/min.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130  
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



[vendas@farmacam.com.br](mailto:vendas@farmacam.com.br)



[whatsapp \(21\) 98493-7033](https://www.whatsapp.com/channel/00299100000000000000)



[Facebook.com.br/farmacam](https://www.facebook.com/farmacam)



[Instagram.com.br/farmacam](https://www.instagram.com/farmacam)