

OXIBUTININA HCl

A Oxibutinina exerce seu efeito antiespasmódico direto sobre o músculo liso da bexiga retardando o desejo de urinar através da inibição da ação da acetilcolina nos pontos colinérgicos pós-ganglionares, não bloqueia os efeitos da acetilcolina nas uniões neuromusculares esqueléticas nem nos gânglios autonômicos. Tão pouco tem efeito sobre o músculo liso dos vasos sanguíneos. Tem atividade anti-histâmica moderada, certa atividade anestésica local e analgésica leve. Absorve-se com rapidez no trato gastrointestinal, metaboliza-se no fígado e elimina-se por via renal.

SINÔNIMOS: Oxybutynin, Oxybutinine, Oxybutinium

CAS: 5633-20-5

PM: 357,5

INDICAÇÕES: A Oxibutinina é indicada nos sintomas de distúrbios urológicos relacionados com a micção em pacientes com contrações não inibidas da bexiga neurogênica e nos caso de bexiga neurogênica reflexa.

DOSES E USOS: Adulto: 5mg, 2 a 3 vezes/dia. Dose máxima: 5mg, 4 vezes/dia. Criança maiores de 5 anos: 5mg, 2 a 3 vezes/dia, sem ultrapassar a dose de 15mg/dia.

REAÇÕES ADVERSAS: São de incidência mais frequentes: constipação, sonolência, secura na boca, nariz e garganta, visão turva, micção difícil, náuseas vômitos e cansaços não habituais.

PRECAUÇÕES: Evitar o consumo de álcool ou de outros depressores do SNC, pois pode aumentar a fotossensibilidade ocular. Em pacientes com diarreia, deve-se excluir a possibilidade de obstrução intestinal antes de indicar a Oxibutinina. O uso prolongado de Oxibutinina pode diminuir ou inibir o fluxo de saliva, o que contribui para o desenvolvimento de cáries, doenças periodontal, candidíase oral.

INTERAÇÕES: O uso simultâneo com outros medicamentos antimuscarínicos potencializa este efeito, bem como aqueles que são depressores do SNC exarcebam seu efeito sedativo ou da Oxibutinina.

CONTRA-INDICAÇÕES: A Oxibutinina é contra-indicada em pacientes com hipersensibilidade à droga. A relação risco/benefício deverá ser avaliada em estenose mitral, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, disfunção hepática ou renal, hipertensão, hipertireoidismo, colite ulcerosa grave e retenção urinária.

REFERÊNCIAS

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35ª.Ed. PhP: Londres, 2007.

P.R. Vade-mécum. Disponível em: <http://www.prvademecum.com>



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam