

SIMETICONA PÓ

As dimeticonas são silicões fluidos nos quais o grupo orgânico é um radical metila; o grupo inclui diversas substâncias. A **Simeticona** é uma dimeticona ativada ou dimetilpolisiloxana ativada, correspondendo a uma mistura de dimeticonas líquidas contendo dióxido de silício finamente triturado. É desprovido de ação sistêmica que desenvolve um efeito espumolítico-antiflatulento ao atuar como um tensoativo diminuindo a tensão superficial das ilhas espumantes ou bolhas de muco e ar localizados no trato gastrointestinal. Por essa razão, ocorre a liberação do gás por via oral (arrotos) ou retal (flatos) aliviando a distensão e o metabolismo digestivo. A excreção é fecal, sob forma inalterada.

SINÔNIMOS: Activated Dimethicone; Activated Dimethylpolysiloxane; Antifoam AF; Simethicone; Szimetikon.

CAS: 8050-81-5

INDICAÇÕES: A Simeticona é indicada em dispepsias, fermentação intestinal, aerofagia, aerocolia, flatulência gastrointestinal. Como complemento em estudos radiológicos ou ecográficos.

DOSE: Adultos (dose máxima de 500mg/dia).

Via oral, 50 a 100mg quatro vezes/dia, após as refeições e na hora de dormir, ou quando necessário.

Criança: Doses individualizadas, segundo critério médico.

REAÇÕES ADVERSAS: Pode ocorrer eczema de contato, e em casos raros reações como urticárias e broncoespasmo.

CONTRA-INDICAÇÃO: Para pacientes que apresentam distensão abdominal grave, massa abdominal palpável, perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

REFERÊNCIAS: MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35ª.Ed. PhP: Londres, 2007.

<http://www.anvisa.gov.br/base/visadoc>

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro/ ZéGaroto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam