

TENOXICAM

Antiinflamatório e Antireumático

Nome Comum: Tenoxicam

Atividade

Tenoxicam é um isômero do Piroxicam e apresenta propriedades semelhantes a este.

Tenoxicam é um potente inibidor da biossíntese das prostaglandinas. Estudos *in vitro* deduzem que ele neutraliza o oxigênio ativo no foco inflamatório. Age como captador de radicais livres e diminui eficazmente a reação inflamatória.

Tenoxicam é indicado para tratar doenças reumáticas, como a artrite reumatóide, osteoartrite e espondilite anquilosante. Também trata inflamações não reumáticas, como bursite, capsulite, sinovite, tendinite e tenosinovite.

Concentração usual

Nas doenças reumáticas e inflamações não reumáticas, a dose oral é de 20mg/dia (esta também é a dose máxima), sempre na mesma hora do dia. Para alguns pacientes a dose de 10mg/dia é eficaz. Nos ataques da gota aguda, recomenda-se ingestão diária de 40mg/dia durante 2 dias, seguida de 20mg/dia durante outros 5 dias. Pela via retal, aplicar 1 supositório de 20mg ao dia.

Usar as doses eficazes menores possíveis.

Recomenda-se ingerir logo após as refeições ou com antiácidos a fim de amenizar as irritações gastrointestinais.

Reações adversas

Gastralgias, náuseas, vômitos, vertigem, constipação, prurido, exantema, dentre outros.

Observação

Doses maiores do que as indicadas aumentam o risco de efeitos adversos sem a melhora da eficácia terapêutica.

Armazenamento

Manter distante da luz, umidade e calor.

