

SULPIRIDA (Portaria 344/98 – Lista C1)

É um neuroléptico do grupo das benzodiazepinas, antagonista farmacológico da dopamina. Bloqueia os receptores dopaminérgico (D2) pós-sinápticos de forma seletiva, fazendo com que seja menos tolerada e produzindo menos efeitos adversos. Também bloqueia os receptores dopaminérgicos auto-inibitórios pré-sinápticos, aumentando a quantidade de neuro-transmissor na fenda sináptica. Administrada por via oral, é absorvida do trato gastrointestinal em 4,5 horas. Excretada principalmente (50 a 70%) pela urina, o resto pelas fezes.

SINÔNIMOS: Sulpiride, Sulpirid, Sulpiridas, Sulpirid, Sulpiridum, Szulpirid.

CAS: 15676-16-1

PM: 341,4

INDICAÇÕES: Tratamento de estados neuróticos depressivos, algumas síndromes vertiginosas e esquizofrenia.

DOSES E USOS: Via oral, adultos, estados neuróticos depressivos, 100 a 200mg ao dia, em 2 tomadas (manhã e noite); síndromes vertiginosas, 150 a 300mg ao dia, em 2 tomadas; esquizofrenia, 400 a 800mg ao dia, em 2 tomadas. As doses podem ser aumentadas até o máximo de 1200mg ao dia. Via oral, adultos, sintomas predominantemente excitatórios, inicialmente 400mg 2x/dia e aumentando-se até 1200mg/dia; sintomas predominantemente depressivos, 800mg ao dia; pacientes com sintomatologia mista, 400 a 600mg 2x/dia.

REAÇÕES ADVERSAS: Sedação ou sonolência; discinesias precoces e tardias; síndrome extrapiramidal; crises hipertensivas; hipotensão ortostática; impotência, frigidez; amenorréia, galactorréia, ginecomastia, hiperprolactinemia; aumento de peso.

PRECAUÇÕES: Em caso de hipertermia, deve-se suspender o tratamento. Deve ser usada com prudência em idosos, epiléticos e parkinsonianos. Deve-se reduzir a dose nos pacientes com insuficiência renal grave.

INTERAÇÕES: Potencializa os efeitos de anti-hipertensivos, depressores do SNC (como analgésicos, anestésicos, hipnóticos e tranqüilizantes) e hipertensores. Antagoniza os efeitos da levodopa.

CONTRA-INDICAÇÕES: Feocromocitoma. Primeiro trimestre da gravidez.

REFERÊNCIAS

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35ed. PhP: Londres, 2007.

RANG, H.P., DALE, M.M. RITTER J.M. **Pharmacology**. 3ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 1997

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro/ Zé Garoto Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam