

FENOFIBRATO

Hipolipemiante

Indicações:

Coadjuvante com a dieta no tratamento dos distúrbios lipídicos. Dislipemias tipo IIb, III e IV.

Propriedades:

O fenofibrato é um composto relacionado estruturalmente com o clofibrato, embora tenha menor toxicidade e maior que este, que pertence ao grupo dos ácidos fibrícos. Os ésteres do ácido fibríco são rápida e completamente absorvidos no trato gastrointestinal, particularmente quando são administrados junto com as refeições.

Contraindicações:

Gravidez e lactação. Insuficiência renal ou hepática.

Dose Usual / Posologia:

Adultos: 300mg diários divididos em 3 ingestões, junto com as principais refeições.

Crianças maiores de 10 anos: 5mg/kg/dia.

Precauções:

Reduzir a dose na presença de insuficiência renal leve. Controle trimestral das transaminases séricas durante o primeiro ano.

Reações Adversas:

Dispepsias, náuseas (ocasionalmente). Reações alérgicas cutâneas, sensação de calor, rubor (no início do tratamento).

Interações Medicamentosas:

Pode potencializar o efeito e a toxicidade da fenitoína, dos hipoglicemiantes orais e dos anticoagulantes orais (vigiar o tempo de protrombina e ajustar a dose do anticoagulante). Não associar com medicamentos potencialmente hepatotóxicos (IMAO, perexilina).

Informações Farmacotécnicas:

Não consta.

Referências Bibliográficas:

1. P.R. Vade-mécum Brasil. 2006/2007

