

## BEZAFIBRATO

O Bezafibrato, é um hipolipemiante pertencente ao grupo dos fibratos, possui uma estrutura mutável que o diferencia dos hipolipemiantes clássicos, quando a incidência de efeitos colaterais. O Bezafibrato reduz fundamentalmente os níveis plásticos de triglicídios e de lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL).

### INDICAÇÕES:

Bezafibrato é indicado nos distúrbios metabólicos lipídicos quando não forem suficientes as medidas dietéticas. Hiperlipoproteinemias IIb, III, IV e V de Fredrickson.

### DOSE:

A dose usual é de 400mg diários, de preferência após as refeições.

### REAÇÕES ADVERSAS:

São pouco freqüentes e, em geral, diminuem de intensidade em poucas semanas, sem necessidade de interrupção do tratamento: distúrbios gastrintestinais, erupções cutâneas, sonolência, fadiga, cefaléia, dores e cãibras musculares.

### PRECAUÇÕES:

-Antecedentes de Colelítase.  
-No início do tratamento, deverão ser realizados controles de lipídios plasmáticos a cada 2 semanas.

### INTERAÇÕES:

Pode potencializar os efeitos e a toxicidade da fenitoína, dos hipoglicemiantes e anticoagulantes orais.

### CONTRA INDICAÇÕES:

Afecções hepáticas graves, cirrose biliar primária. Alterações da função renal com valores de creatinina sérica superiores a 6mg/100ml, na síndrome nefrótica, gravidez e lactação.

