

## PAROXETINA

Paroxetina é um derivado fenilpiperidínico, inibidor potente e seletivo da recaptação neuronal da serotonina (5-HT) cuja atividade antidepressiva deve estar ligada à potencialização serotoninérgica no SNC; essa inibição prolonga a atividade da serotonina nos receptores pós-sinápticos. A absorção gastrintestinal é boa com biodisponibilidade entre 50 a 100%. Ligação protéica alta. A concentração sangüínea máxima é atingida entre 2 a 8 horas. O início do efeito está entre 1 a 4 semanas. A biotransformação é hepática e a eliminação é renal (64%) e fecal (36%).

### INDICAÇÕES:

A Paroxetina é indicada em pacientes com depressão mental.

### DOSE:

Adultos: Via oral, dose inicial de 20 mg/dia preferencialmente pela manhã; aumentar a dose com acréscimos de 10 mg/dia com intervalos de 7 dias, conforme a necessidade e tolerabilidade, até o máximo de 50 mg/dia. Idosos: a dose inicial é de 10 mg/dia, aumentando-a até o máximo de 40 mg/dia.

Crianças: eficácia e segurança não definidas.

### REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: astenia, constipação, diarréia, tontura, sonolência, cefaléia, insônia, náusea, disfunções sexuais. Reações ocasionais: agitação, mialgia, hipotensão ortostática, exantema, ansiedade, visão turva, anorexia, palpitação, alterações no paladar, perda ou ganho de peso.

### PRECAUÇÕES:

- A ingestão da dose pela manhã tem a finalidade de diminuir os distúrbios do sono e de outras reações adversas. A suspensão abrupta da Paroxetina pode resultar em sintomas de abstinência.
- Pacientes potencialmente suicidas não devem ter acesso ao medicamento.
- O uso prolongado pode diminuir ou inibir o fluxo salivar contribuindo para o desenvolvimento de cáries, doenças periodontais, candidíase e desconforto orais.

### INTERAÇÕES:

O uso concomitante de IMAO, inclusive furazolidona, procarbazina e selegilina pode causar confusão, agitação, intranquilidade, sintomas gastrintestinais, convulsões, crise hipertensiva e síndrome serotoninérgica. O triptofano aumenta o risco da síndrome serotoninérgica.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

Paroxetina é contra-indicada em pacientes hipersensíveis à droga. O risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: uso abusivo ou dependência às drogas, comprometimentos hepáticos ou renais, mania e convulsões.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam