



## PIZOTIFENO

O Pizotifeno é um agente anticefaléico, que apresenta efeito inibitório sobre a ação das aminas biógenas como a serotonina, histamina e triptamina. É utilizado no tratamento profilático das enxaquecas, diminuindo a frequência das crises. Possui atividade estimulante e antidepressiva. Sua biodisponibilidade por via oral é de 80%. Sua meia-vida é de 1 hora. Liga-se às proteínas, em 91%, sendo eliminado pelos rins.

### INDICAÇÕES:

O Pizotifeno é indicado no tratamento de cefaléias vasculares como enxaqueca típica e atípica, cefaléias vasomotoras, síndrome de Horton.

### DOSE:

Adulto: dose inicial de 0,5mg/dia, dose de manutenção de 1,5mg/dia, em dose única ou fracionada. Crianças acima de 12 anos: dose inicial de 0,5mg dose fracionada ou 1mg em dose única.

### REAÇÕES ADVERSAS:

O Pizotifeno pode causar sedação, vertigem, secura na boca, náuseas, constipação. Em crianças pode ocorrer estímulos do SNC. SUPERDOSE: pode ocorrer: sonolência, hipotensão, enjôos, náuseas, excitação em crianças, depressão respiratória, convulsões e coma. O tratamento consiste na administração do carvão ativado, seguido de tratamento sintomático. Se ocorrer convulsões ou excitação, recomenda-se administrar benzodiazepínicos.

### PRECAUÇÕES:

- O Pizotifeno promove estimulação do apetite, podendo gerar ganho de peso.
- Evitar funções onde a falta de atenção aumenta o risco de acidentes.
- Administrar com cautela em pacientes com glaucoma de ângulo fechado.

### INTERAÇÕES:

O Pizotifeno pode potencializar os efeitos de sedativos, hipnóticos, anti-histamínicos e do álcool.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

O Pizotifeno é contra-indicada em pacientes hipersensíveis a droga, o risco/benefício deve ser avaliado durante a gravidez. O aleitamento deve ser suspenso. A segurança e a eficácia da droga em crianças com idade inferior a 12 anos ainda não foram estabelecidas.

