

CistCare[®] é um nutracêutico simbiótico sinérgico que associa a fibra prebiótica de cranberry a um probiótico (*Bacillus coagulans* MTCC 5856), que comprovadamente modula a microbiota intestinal e urogenital, auxiliando na prevenção das infecções do trato urinário (ITUs) recorrentes.

O cranberry fornece substrato fermentável rico em fibras e proteínas, atuando como matriz nutricional seletiva que favorece a viabilidade e a atividade metabólica do probiótico, potencializando seus efeitos.

O *Bacillus coagulans* formadora de esporos, o que garante a estabilidade, resistência ao processo produtivo e viabilidade até o consumo.

Qual é o diferencial do CistCare[®]?

Critério	Cranberry presente no CistCare [®]	Cranberry extrato padronizado comum
Função prebiótica	✓ Alta	↓ Baixa
Compatibilidade com <i>B. coagulans</i> MTCC 5856	✓ Alta	! Pode comprometer
Ideal para simbiótico	★★★★★	★



Cranberry orgânico

-  57,7% de fibras
-  19,6% de proteínas
-  5,6% de proantocianidinas

Posologia

-  Dose sugerida: 250mg, 1 a 2 vezes ao dia.
Dose máxima diária: 750 mg
-  Horário: livre, seguro para uso prolongado.

CistCare[®] previne as reincidências das ITUs

-  Proporciona modulação do microbioma urogenital e intestinal, contribuindo para a redução das ITUs e cistites recorrentes;
-  Contribui para a inibição da colonização de uropatógenos, especialmente *Escherichia coli*;
-  Estratégia não antibiótica, com foco na prevenção e manutenção da saúde urogenital.

Comprovação científica de resultados


Eficácia do **CistCare®** na redução do crescimento da *E. coli* e produção elevada de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), especialmente ácido propiônico, associado à proteção contra uropatógenos.

Majeed et al., International Journal of Food Science and Technology, 53, 7, 1640–1647, 2018.

Resultados

O **CistCare®** apresentou elevada resistência ao ácido gástrico e à hidrólise pancreática, preservando sua integridade ao longo do trato gastrointestinal. Observou-se redução significativa da contagem de *E. coli*, reforçando seu potencial na prevenção de ITUs recorrentes e episódios de cistites. Esse achado é clinicamente relevante, uma vez que a *E. coli* é responsável por mais de 75% dos casos de infecção urinária.

Análise da inibição do crescimento de *Escherichia coli* in vitro



CistCare® apresentou resultados superiores na inibição do crescimento da *E. coli* em comparação aos controles (cranberry, meio de cultura e *B. coagulans* isolado).

CistCare®




Crescimento do probiótico
B. coagulans MTCC 5856



Viabilidade de
E. coli

Análise da resistência à digestibilidade pelo ácido gástrico in vitro



Cranberry



Apenas 1,4% nos açúcares redutores

Sugere **não digestibilidade**, permanecendo disponível como prebiótico para **fermentação do *B. coagulans* MTCC 5856**.

Protocolos

Saúde do trato urinário e prevenção da cistite recorrente:

CistCare® 250mg
Excipiente qsp 1 cápsula



Posologia: Ingerir 1 cápsula, 1 a 2 vezes ao dia.

Referências bibliográficas.

Dossiê técnico do fabricante.

Majeed et al., International Journal of Food Science and Technology, 53, 7, 1640–1647, 2018.

Cistites recorrentes no climatério:

CistCare® 250mg
+Berry 80mg
Genisteína 40mg
Cimicífuga racemosa 40mg
Excipiente qsp 1 dose



Posologia: Ingerir 1 dose à noite, ou conforme orientação do prescriptor.



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam