

RISPERIDONA (C1)

CAS: 106266-06-2

DCB: 07748

Fórmula Molecular: $C_{23}H_{27}FN_4O_2$

Peso Molecular: 410,50

Composição: Não aplicável.

Uso: Oral.

Risperidona é um fármaco pertencente ao grupo de antipsicóticos-neurolépticos atípicos que possui uma eficácia similar à dos clássicos porém, com sintomas extrapiramidais mais atenuados.

Ela age reajustando o equilíbrio de substâncias químicas no cérebro, como a dopamina e a serotonina utilizada para tratar esquizofrenia, transtornos bipolares, irritabilidade associada ao transtorno autista e sintomas psicóticos em pessoas com demência do tipo Alzheimer.

O mecanismo de ação reajusta o equilíbrio de substâncias químicas no cérebro, como a dopamina e a serotonina, ao bloquear seletivamente os receptores 5-HT₂ (serotonina) e D₂ (dopamina), além de afetar os receptores alfa 2-adrenérgicos e histaminérgicos H₁.

Além disso a risperidona é eficaz no tratamento de várias condições mentais, ajudando a estabilizar sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

INDICAÇÕES

- Tratamento de manutenção de psicoses esquizofrênicas agudas e crônica;
- Transtornos bipolares;
- Irritabilidade associada ao transtorno autista;
- Sintomas psicóticos em demência do tipo Alzheimer.

DOSAGEM SUGERIDA

- **Oral:** 1 a 8mg ou conforme prescrição.
- **Tópico:** Não aplicável.
- **Fator de correção:** Não aplicável.

ADVERTÊNCIAS

O seu uso não está autorizado para gestantes, lactantes e para pessoas com: insuficiência hepática, insuficiência renal, doença de Parkinson e epilepsia. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper o uso do produto e consultar o médico.

Insônia, agitação, ansiedade, cefaleia, sonolência, fadiga, dificuldade de concentração, constipação, visão turva, dispepsia, náusea, dor abdominal, obstrução nasal, erupção cutânea, diminuição da libido, ginecomastia, ganho de peso, intoxicação hídrica, efeitos extrapiramidais, mas menos do que os causados pelos antipsicóticos, clássicos, como o haloperidol: tremor, rigidez muscular, hipersalivação, bradicinesia, acatisia, distonada aguda, hiperprolactinemia: galactorreia, distúrbio do ciclo menstrual, amenorreia, hipotensão e tontura ortostáticas, taquicardia reflexa, acidente vascular cerebral, rabdomiólise.

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de outros depressores centrais.

INFORMAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Conservar em local seco e protegido da luz.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Risperidona (Solução oral)

Problemas comportamentais graves em crianças, autismo, psicoses esquizofrênicas agudas e crônicas.

Componentes	Quantidades
Risperidona	1mg
Veículo qsp	1 ml
Posologia: Iniciar com 1 mg 2 vezes ao dia no primeiro dia, aumentar para 2 mg 2 vezes ao dia no segundo dia e 3 mg 2 vezes ao dia no terceiro dia; manutenção -2 a 4 mg 2 vezes ao dia.	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

REFERÊNCIAS

1. Material técnico do fabricante.
2. BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO, Y. Formulário Médico Farmacêutico. 6.ed. São Paulo: Pharmabooks. 2021.
3. Guia Prático da Farmácia Magistral 5. Edição, Juiz de Fora Pharmabooks. 2019.
4. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2014/2015.

Rev.1 – 25/11/2024.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam