

SIBUTRAMINA HCL MONOHIDRATADA (B2)

IDENTIFICAÇÃO

FÓRMULA MOLECULAR: C₁₇H₂₆ClN, HCL, H₂O

PM: 342,3 (Forma monohidratada)

DCB: 09375 (Cloridrato de Sibutramina Monohidratada)

CAS: 125494-59-9

SINÔNIMOS: N-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N-dimethylamine hydrochloride monohydrate 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate

FATOR DE CORREÇÃO: Aplicável

USO: Interno

PROPRIEDADES:

O cloridrato de Sibutramina monohidratado está indicado no tratamento da obesidade, ou quando a perda de peso está clinicamente indicada; deve ser usado em conjunto com dieta hipocalórica e exercícios, como parte de um programa de gerenciamento de peso, quando somente a dieta e exercícios comprovam-se ineficientes.

A Sibutramina é recomendada para pacientes obesos com um índice de massa corporal inicial (IMC) 30 kg/m², ou 27 kg/m² na presença de outros fatores de risco (ex.: hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia).

Atua inibindo a receptação de norepinefrina (NE) e de 5-hidroxitriptamina (5-HT), sendo os dois metabólitos muito mais potentes. Possui baixa afinidade pelos receptores serotoninérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, muscarínicos, histaminérgicos, de glutamato e de benzodiazepínicos.

Ao contrário da fenfluramina e anfepramona, a sibutramina e seus metabólitos não aumentam a liberação neuronal de NE, de 5-HT ou de dopamina e não inibem a atividade da monoaminoxidase. A capacidade de reduzir a ingestão de alimentos, em modelos animais, resulta de uma intensificação da saciedade. A redução de peso é aparente em torno da quarta semana e máxima na sexta.

INDICAÇÃO

Para tratamento de obesidade e redução de peso corpóreo, em conjunto com dieta e exercícios.

DOSE E USO

A dose inicial recomendada é de 1 cápsula de 10 mg por dia, pela manhã, com ou sem alimentação.

Se o paciente não perder pelo menos 2 kg nas primeiras 4 semanas de tratamento, o médico deve considerar a reavaliação do tratamento, que pode incluir um aumento da dose para 15 mg ou a descontinuação da Sibutramina. No caso de titulação da dose, deve-se levar em consideração os índices de variação da frequência cardíaca e da pressão arterial.

Doses acima de 15 mg ao dia não são recomendadas.

O uso da Sibutramina demonstrou ser seguro e efetivo por até 24 meses em estudos duplo-cego placebo controlados.

No caso de esquecimento de uma dose, a cápsula deve ser ingerida em outro horário do mesmo dia, sem prejuízo do tratamento.

REAÇÕES ADVERSAS

- Cefaleia, dor nas costas, artralgia, astenia, dor abdominal, reações alérgicas, vasodilatação, taquicardia, enxaqueca
- Anorexia, constipação, náusea, dispepsia, aumento do apetite, vômitos
- Boca seca, insônia, vertigem, sonolência, labilidade emocional.
- Dismenorreia
- Insuficiência aórtica
- Hipertensão Arterial, acidente vascular cerebral
- Dor e hemorragia oculares

PRECAUÇÕES

- Cautela, na administração de neofropatas
- Deve ser usado com cuidado em pacientes com história de epilepsia. Em caso de convulsão durante o tratamento, deve ser suspensa
- Como outros fármacos de ação central, pode afetar a capacidade de julgamento do paciente durante a atividades que exijam atenção
- Deve ser usado com cautela em pacientes com doenças cardíacas

CONTRAINDICAÇÕES

- Hipersensibilidade à sibutramina
- Gravidez
- Lactação
- Crianças e jovens de até 18 anos e idosos > 65 anos
- Hipertensão moderada a grave
- Consumo de álcool
- Durante a administração de inibidores da MAO ou dentro de 14 dias após esta
- Uso concomitante de outros fármacos de ação central para redução de peso

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Cetoconazol pode inibir o metabolismo da sibutramina
- O tratamento concomitante com antagonistas adrenérgicos como metropolol, prazosina ou antagonistas de 5-HT, como a metergolina e ritanserina, pode diminuir seu efeito

SUGESTÃO DE FÓRMULA:

Cloridrato de Sibutramina	5 a 15 mg
Excipiente qsp	1 cápsula

POSOLOGIA

dose inicial - 10 mg pela manhã; dose de manutenção 5 a 15mg ao dia.

REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014.

Rev.1 - 13/07/2018 RT/SAC

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam