

SIMETICONE PÓ 50%

CAS: 8050-81-5

DCB: 08006

Fórmula Molecular: Não aplicável

Peso Molecular: Não aplicável

Composição: Simethicone Pó /Dióxido de Silício Coloidal

Uso: Oral

A simeticona é também conhecida como dimeticona e consiste em uma mistura de polissiloxanas dimetilicas e sílica gel adequadamente purificada para emprego farmacêutico. In vitro reduz a tensão superficial das bolhas gasosas.

Após administração, em um período de 10 e 30 minutos após a sua ingestão, a simeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas, à dificuldade de formação destas bolhas, ou à formação de bolhas maiores que serão facilmente expelidas.

Indicações:

- Antifisético, auxiliar de diagnóstico (gastroscoopia, radiografia do intestino);
- Alívio de sintomas relacionados ao excesso de gases;
- Melhora do desconforto abdominal.
- Aerofagia pós-cirúrgica.

Dosagem Sugerida:

- **Oral:** até 40 mg, três vezes ao dia, após as refeições e ao deitar-se. Crianças devem ter suas doses prescritas pelo médico.
- **Tópico:** Não aplicável.
- **Fator de correção:** Aplicar fator de acordo com o teor e umidade descritos no certificado de análise

Advertências:

O seu uso não está autorizado para gestantes e lactantes. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper/não usar o produto e consultar o médico.

Efeitos Adversos:

- Constipação moderada e transitória. Podem ocorrer diarreia, náusea, regurgitação e vômito.

Sugestões de Fórmulas:

Antiácido e laxante

Componentes	Quantidades
Hidróxido de Magnésio	400 mg
Simeticone	30 mg
Veículo edulcorado e aromatizado qsp	5 ml
Mande frasco.....ml	
Posologia: 1 a 4 medidas de 5 ml diluídas em água.	

Antiemético

Componentes	Quantidades
Domperidona	10 mg
Simeticone	80 mg
Carbotil UG qsp	1 cápsula
Posologia: 1 dose duas vezes ao dia.	

Hepatoprotetor

Componentes	Quantidades
Boldo Extrato Seco	100 mg
Bromoprida	5 mg
Simeticone	100 mg
Metionina	200 mg
Carbotil AG qsp	1 cápsula
Posologia: 1 cápsula no almoço e no jantar.	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

Referências:

1. Material técnico do fabricante.
2. BATISTUZZO, J.A.; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/ SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021 2.
3. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2014/2015.

Rev.0 – 02/03/2023 SAC.