

Zolpidem Hemitartarato (B1)

CAS: 99294-93-6

DCB: 09296

Fórmula Molecular: C₄₂H₄₈N₆O₈

Peso Molecular: 764,86

Composição: zolpidem hemitartarato

Uso: Oral

O hemitartarato de zolpidem é um agente hipnótico pertencente ao grupo das imidazopiridinas. Tem se mostrado efetivo no tratamento continuado da insônia em vários estudos observacionais. Está associado com significativa melhoria da qualidade de sono e menor sonolência durante o dia quando comparado com placebo.

Este medicamento deve ser usado apenas com prescrição e acompanhamento médico. O histórico do paciente deve ser observado para que a melhor dosagem possa ser aplicada ao tratamento.

Indicações:

- Tratamento por prazo curto de insônia ocasional, transitória ou crônica;
- Melhora da qualidade do sono.

Dosagem Sugerida:

- **Oral:** 5 a 10 mg ao dia. Pacientes com insuficiência hepática devem iniciar com a dose de 5 mg/dia e não deve exceder 10 mg/dia.
- **Tópico:** Não aplicável.
- **Fator de correção:** Avaliar o doseamento presente no certificado de análise.
- **Fator de equivalência:** Não aplicável.

Advertências:

O seu uso não está autorizado para crianças menores de 15 anos, gestantes e lactantes. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper o uso do produto e consultar o médico.

Efeitos Adversos:

Sonolência, tontura, depressão mental, ataxia, confusão, amnésia anterógrada, sonambulismo, alergia, anafilaxia, exantema, hipotensão, alucinações, pesadelos, irritabilidade, palpitações, boca seca, letargia, sinusite, diarreia, náusea, vômito, cefaleia, mal-estar, dor abdominal, erupções cutâneas, prurido, dependência (com uso prolongado).

Informações Farmacotécnicas:

- Insumo higroscópico e pertence a classe biofarmacêutica I.
- Usar preferencialmente o Carbotil UG.

Sugestões de Fórmulas:

Tratamento da insônia

Componentes	Quantidades
Zolpidem	5 a 10 mg
Carbotil UG	Qsp
Posologia: adultos - 10 mg ao deitar-se, pacientes idosos ou debilitados 5 mg ao deitar.	

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.

Referências:

1. Material técnico do fabricante.
2. Dicionário Terapêutico Guanabara Edição 2014/2015.
3. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/ SP: Atheneu, 6ª Ed. 2021.

Rev.0 – 31/01/2023 SAC

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-9480



vendas@farmacam.com.br



WhatsApp (21) 2604-7350



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam