Uso: Externo/Interno

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: Não se aplica

CAS: 89796-99-6

FM: $C_{16}H_{13}Cl_2NO_4$

PM: 354,2

Comprar AGORA!

ACECLOFENACO
ANTI-INFLAMATÓRIO

O Aceclofenaco é um anti-inflamatório não hormonal, analgésico e antipiréico, derivado do ácido fenilacético. Seu mecanismo de ação está relacionado à diminuição da produção de prostaglandinas, por inibição da ciclooxigenase.

Recomendação de uso

Para uso interno, a dosagem usual é de 100mg a 200mg ao dia.
Para uso externo, em formulações tópicas, indica-se 1,5%.

Aplicações

O uso de Aceclofenaco está indicado no tratamento de processos inflamatórios como odontalgias, traumatismos, dores musculares, artrite reumatoide, osteoartrite e espondilite anquilosante. É usado também em formulações tópicas, em processos dolorosos e inflamatórios como artroses, tendinites, tenossinovites, epicondilites, tumefação e dor pós traumática.

Mecanismo de ação

O Aceclofenaco é rapidamente absorvido após administração oral, e em 30 minutos já se pode verificar o seu efeito analgésico. O pico de concentração plasmática ocorre entre 1 a 3 horas da administração oral, e a meia vida de eliminação plasmática é de 6 a 7 horas. Tem ampla difusão tecidual, especialmente no líquido sinovial, onde atinge concentrações elevadas. Ensaios clínicos comparativos com outros anti-inflamatórios não hormonais, particularmente com os derivados do ácido fenilacético, mostraram uma menor incidência de reações adversas gastrointestinais e hepáticas, e consequentemente uma maior aderência ao tratamento.

Reações adversas

Os efeitos adversos mais comuns causados pelo uso de Aceclofenaco são transtornos digestivos, náuseas e diarreias. Geralmente são leves e reversíveis. Alguns efeitos mais raros atingem o SNC, e consistem em cefaleia, vertigem, sonolência, entre outros.

Interações

A principal interação do Aceclofenaco, como outros anti-inflamatórios não hormonais, consiste no aumento dos efeitos dos anticoagulantes orais, aumento das concentrações plasmáticas de lítio e glicosídeos cardiotônicos.

Precauções

Para o uso do Aceclofenaco, deve-se ter precaução em pacientes com distúrbios gastrointestinais ou hematopoiéticos, e em afecções hepáticas, cardíacas ou renais graves. Deve ser usado em dosagens reduzidas em pacientes idosos e seu uso não é recomendado durante a gravidez.

Contra Indicações

O Aceclofenaco é contra indicado em pacientes com úlcera gastroduodenal. Também é contra indicado na hipersensibilidade ao fármaco, ou nos pacientes a quem o ácido acetil salicílico e outros anti-inflamatórios não hormonais desencadeiem urticária ou reações alérgicas.

Referências Bibliograficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 3ª Ed. 2006.
2. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta Farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.

Última atualização: 21/06/2017 BM