Uso: Externo

PM: 412,52g/mol

Fator de Correção: Não se aplica

FM: $C_{28}H_{28}O_3$

Fator de Equivalência: Não se aplica

ADAPALENO
RETINÓIDE

Indicação

O **Adapaleno** é uma molécula derivada do ácido naftóico, com propriedades biológicas similares às do ácido retinóico. Suas propriedades farmacológicas lhe conferem a habilidade de controlar a proliferação e diferenciação celular, prevenir e eliminar comedões. Também apresenta eficiente atividade antiinflamatória na acne. É indicado para o tratamento tópico da acne vulgaris. Tem-se mostrado mais eficaz quando usado concomitantemente com a clindamicina. O **Adapaleno** promove a renovação celular da pele, de forma menos agressiva que o ácido retinóico.

Recomendação de uso

Creme, gel e loções a 0,1%.
É aplicado uma vez ao dia, após higienização e antes de dormir. Em algumas circunstâncias, quando o paciente apresenta irritação da pele, a aplicação pode ser feita em dias alternados até que a irritação cesse.

Contra indicações

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Também é contra-indicado o uso em pacientes hipersensíveis à substância. Não deve ser usado simultaneamente a outros retinóides.

Efeito Colateral ou Adverso

O **Adapaleno** pode provocar coceira, vermelhidão, descamação e queimação em alguns pacientes; nestes casos, recomenda-se a suspensão temporária do medicamento até que a pele se acostume. Deve-se evitar o contato do produto com as mucosas.
Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA - Lista-C2.

Referências Bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4ª Ed. 2011.
2. WEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
3. http://pt.wikipedia.org/wiki/Adapaleno (consultado em 08.01.2009).

Última atualização: 07/08/2013 MJD
12/11/2015 AM